

There are no translations available.

MOTIVO DE CONSULTA: Dolor vulvo-vaginal.

ANTECEDENTES:

- **Familiares:** Madre DM2.

- **Personales:** Amigdalectomía. Niega alergias

- **Gineco-obstétricos:** Menarquía 14 años, eumonorreica, G1P1.

ENFERMEDAD ACTUAL: Puérpera de 5 días , con antecedente de parto finalizado mediante ventosa por alivio de expulsito, que consulta por dolor en zona de episiotomía de menos de 24 h de evolución.

EXPLORACIÓN FÍSICA: Temperatura 36.5°C. Se visualiza dehiscencia completa de plano muscular profundo y superficial, con integridad de plano vaginal. Los bordes de la cicatriz presentan buen aspecto, presenta tejido de granulación en planos profundos y tejido fibrinoso en planos superficiales. Tacto vaginal: plano vaginal íntegro, palpándose sutura no a tensión. Loquios no malolientes, tacto vaginal no doloroso. No se objetivan tractos fistulosos. Tacto rectal íntegro, conservando buen tono de esfínter anal.

Dehiscencia de episiotomía.

Friday, 24 May 2013 08:32 - Last Updated Friday, 24 May 2013 09:53



Dehiscencia de episiotomía en una paciente con cicatrización, aunque