

Varón de 75 años. Acude a consulta por una gran lesión pigmentada en la mejilla izquierda, que le preocupa a la familia porque sangra en ocasiones y le afea. PROFESIÓN: pastor jubilado.

Hace ya mucho tiempo (años) presentaba en el mismo lugar una lesión pigmentada plana que crecía con lentitud a lo largo de los años a la cual no dió importancia. Progresivamente algunas zonas cambiaron de color, oscureciéndose. Hace aproximadamente 2 años se abulta y en ocasiones sangra.



### *DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES*

**INSPECCION:** Nódulo negro de superficie erosiva, sobre placa pigmentada de color marrón oscuro, de borde irregular y forma asimétrica. 5 cm de diámetro máximo.

**PALPACION:** Consistencia elástica. Sangrado fácil ante la manipulación. Base infiltrada, adherida a planos profundos. Se palpa 1 adenomegalia submandibular ipsilateral.

**LOCALIZACION/EXTENSION:** Mejilla izquierda. No hay otras lesiones pigmentadas en el tegumento. No se observan placasacrómicas.

---

### *DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL*

Melanoma

### *PRUEBAS COMPLEMENTARIAS*

Extirpación de la lesión sin márgenes para el estadiaje. En este caso el índice de Breslow supera los 4 mm por el carácter nodular de la lesión. Ver [Caso en Anatomía Patológica](#)

La Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) del ganglio submandibular permitirá diagnosticar una más que probable metástasis y descartar la posibilidad de que se trate de una linfadenopatía inflamatoria.