

There are no translations available.

Varón de 57 años. Desde hace unos 10 años han surgido unas lesiones sobreelevadas y de color oscuro en el cuello. En general son asintomáticas aunque le resultan molestas cuando usa camisas con cuellos cerrados o se pone cadenas con medallas en el cuello. Las lesiones crecen lentamente y surgen nuevas en la zona. Además refiere lesiones similares en el tórax, pero más planas.

Su padre también tenía lesiones de este tipo.



DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES

Lesión elemental: pápulas sesiles y pediculadas de 0,3 a 1 cm de diámetro. Bordes bien delimitados y formas redondas u ovaladas. Pigmentación uniforme. Con luz tangencial, se observa una superficie lisa y uniforme con un brillo satinado.

Exploraciones recomendadas:

- **PALPACIÓN DE LA LESIÓN Y DE SU BASE:** se encontrará una consistencia elástica-blanda, con una base NO infiltrada. Las lesiones están BIEN DELIMITADAS. □

¿Qué espera encontrar en el análisis HISTOPATOLÓGICO?

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Nevus pigmentario, Nevus epidérmico, Fibromas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En general el diagnóstico clínico es suficiente, pero en caso de duda puede ser conveniente realizar un estudio histopatológico. Ver [Caso en Anatomía Patológica](#) y

[Microscopio virtual](#) (cedido por en Dr E. Poblet, Universidad de Murcia)